

## 都 7 7 悪性高血圧

下記 ①、② のいずれかを満たし、かつ ③ を満たすもの

眼底写真の添付を要す（更新時は提出不要）

① 定型的悪性高血圧（下記①～④のすべてを満たすもの）

- ① 治療前の拡張期血圧が常に 130mmHg 以上
- ② 眼底所見は KW (Kieth-Wagener) IV度で、乳頭浮腫及び網膜出血を示す
- ③ 腎機能障害をきたし、腎不全（血清クレアチニン 5.0 mg/dl 以上）に至ったもの
- ④ 全身症状の急激な悪化を示し、特に脳症状（運動失調、知覚障害、頭痛、めまい、悪心など）や心症状（呼吸困難、胸痛、不整脈など）を伴うもの

② 非定型的悪性高血圧（下記①～③のいずれか 1 項目を満たすもの）

- ① 拡張期血圧が 120mmHg 以上、130mmHg 未満で、上記 ① の②、③、④のすべてを満たすもの
- ② KW III度の高血圧性網膜症（眼底写真添付）で、上記 ① の①、③、④のすべてを満たすもの
- ③ 腎機能障害（血清クレアチニン 3.0 mg/dl 以上）はあるが腎不全には至らないもので、上記 ① の①、②、④のすべてを満たすもの

③ 8 週間以上の強力な降圧治療後も下記①～③のすべてを満たすもの

- ① 拡張期血圧が 100mmHg 以上
- ② KW III度の高血圧性網膜症で軟性白斑又は網膜出血を示すもの
- ③ 腎機能障害（血清クレアチニン 3.0 mg/dl 以上）を示すもの

### 【認定期間及び更新時基準】

認定基準は原則として 1 年とする。ただし、強力な降圧治療を続けているにもかかわらず上記 ③ を満たす場合は更新を認める。